Dérivation et ses applications

Contenu du programme	Capacités attendues	recommandations pédagogiques
<ul style="list-style-type: none"> • Dérivabilité en un point ; nombre dérivé ; interprétation géométrique ; tangente à une courbe ; approximation d'une fonction dérivable par une fonction affine en un point ; • Dérivabilité à droite ; dérivabilité à gauche ; interprétation géométrique et, demi-tangente ; tangente ou demi- tangente verticale ; point anguleux ; • Dérivabilité sur un intervalle ; dérivée première ; dérivée seconde ; dérivées successives ; • Dérivation de $f + g$; kf ; $f \times g$; $\frac{1}{f}$; $\frac{f}{g}$; $f^n (n \in \mathbb{N}^*)$; $f(ax + b)$ et $\sqrt{f}$; • Equation différentielle : $y'' + w^2y = 0$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Approcher une fonction au voisinage d'un point ; • Reconnaître que le nombre dérivé de la fonction en x_0 est le coefficient directeur de la tangente à cette courbe au point d'abscisse x_0 ; • Reconnaître les dérivées des fonctions de référence ; • Maîtriser les techniques de calcul de la dérivée de fonctions ; • Déterminer une équation de la tangente à une courbe en un point et construire cette tangente ; • Déterminer la monotonie d'une fonction à partir de l'étude du signe de sa dérivée ; • Déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation ou de sa courbe représentative ; • Résoudre des problèmes concernant des valeurs minimales et des valeurs maximales ; • Appliquer la dérivation dans le calcul de certaines limites ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Parmi les exemples à traiter ; On approchera les fonctions : $h \mapsto (1+h)^2$; $h \mapsto (1+h)^3$; $h \mapsto \frac{1}{1+h}$ et $h \mapsto \sqrt{1+h}$ par des fonctions affines au voisinage de 0 • On utilisera $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ pour déterminer la dérivée de chacune des fonctions $x \mapsto \cos(x)$ et $x \mapsto \sin(x)$ • On démontrera les résultats : - Si f est une fonction constante sur in intervalle I alors f' est nulle sur I - Si f est une fonction dérivable et croissante sur un intervalle I alors f' est positive sur I - Si f est une fonction dérivable et décroissante sur un intervalle I alors f' est négative sur I • On admettra les propriétés réciproques dans le cas où f est dérivable ; • On admettra la solution générale de léquation différentielle : $y'' + w^2y = 0$

Dérivabilité d'une fonction en un point

Activité

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x^2$; et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1 Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 2$
- 2 Montrer que la droite (T) passant par le point $A(1, f(1))$ et de coefficient directeur 2 a pour équation : $y = 2x - 1$
- 3 Tracer la droite (T) dans la figure ci-contre.

(T_1) : Droite de coefficient directeur 1.5

(T_2) : Droite de coefficient directeur 3

1 Nombre dérivé

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un élément de I .

On dit que la fonction f est dérivable en a s'il existe un réel l tel que : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$
le réel l est appelé **le nombre dérivé** de f en a , on le note $f'(a)$.

Application

Montrer que la fonction f est dérivable en a et déterminer $f'(a)$ dans chacun des cas ci-après :

- 1 $f(x) = x^2$; $a = \sqrt{2}$
- 2 $f(x) = x^3$; $a = 1$

2 Tangente à la courbe représentative d'une fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel a appartenant à I .

- 1 la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point $A(a, f(a))$ et la droite passant par A de coefficient directeur le nombre dérivé $f'(a)$.
- 2 Une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point A est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Application

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 1 - x^2$

Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1.

3 Dérivabilité à droite / à gauche en un point

Définition

- 1 Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a; a + \alpha[$ tel que $\alpha > 0$. On dit que la fonction f est **dérivable à droite en a** s'il existe un réel l tel que : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$
le réel l est appelé le nombre dérivé de f à droite en a , on le note $f'_d(a)$
- 2 Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a - \alpha; a]$ tel que $\alpha > 0$. On dit que la fonction f est **dérivable à gauche en a** s'il existe un réel l tel que : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$
le réel l est appelé le nombre dérivé de f à gauche en a , on le note $f'_g(a)$

a Interprétation géométrique :

si f une fonction dérivable à droite (ou à gauche) en a alors la courbe représentative de f admet une demi-tangente au point $A(a, f(a))$ de coefficient directeur le nombre dérivé $f'_d(a)$ (ou $f'_g(a)$).

$$(T) : \begin{cases} y = f'_g(a)(x-a) + f(a) \\ x \leq a \end{cases}$$

$$(T) : \begin{cases} y = f'_d(a)(x-a) + f(a) \\ x \geq a \end{cases}$$

$$\begin{cases} (T_1) : y = f'_d(a)(x-a) + f(a) ; x \geq a \\ (T_2) : y = f'_g(a)(x-a) + f(a) ; x \leq a \end{cases}$$

Application

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |1 - x|$. étudier la dérivabilité de f en 1.

Propriété

Soit f une fonction définie sur intervalle ouvert I et a un élément de I .

On dit que la fonction f est dérivable en a si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en a et $f'_d(a) = f'_g(a)$.

4 Demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées

- 1 Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$, alors la courbe représentative de la fonction f admet à droite au point d'abscisse a , **une demi-tangente verticale** dirigée vers le haut.
- 2 Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$, alors la courbe représentative de la fonction f admet à droite au point d'abscisse a , **une demi-tangente verticale** dirigée vers le bas.
- 3 Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$, alors la courbe représentative de la fonction f admet à gauche au point d'abscisse a , **une demi-tangente verticale** dirigée vers le haut.
- 4 Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$, alors la courbe représentative de la fonction f admet à gauche au point d'abscisse a , **une demi-tangente verticale** dirigée vers le bas.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \infty$$

Application

Soit f une fonction définie sur $[-2; 2]$ par : $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

- 1 Montrer que f n'est pas dérivable à gauche en 2. Interpréter géométriquement le résultat.
- 2 Montrer que f n'est pas dérivable à droite en -2. Interpréter géométriquement le résultat.

5 Approximation locale d'une fonction par une fonction affine**Définition**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel a appartenant à I .

- 1 La fonction $x \mapsto f'(a)(x - a) + f(a)$ est appelée la fonction affine tangente de f en a .
- 2 Une approximation affine de la fonction f au voisinage de a est donnée par :

$$f(x) \approx f'(a)(x - a) + f(a)$$

Au voisinage de a , la courbe (C_f) et la droite (T) se confondent, d'où :

$$f(x) \approx f'(a)(x-a) + f(a)$$

Application

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+1)^2$

- 1 Montrer que f est dérivable en $a = 0$ et en $b = 1$.
- 2 Expliciter les fonctions tangentes de f en a et en b .
- 3 donner une approximation affine de chacun des réels $(1.0004)^2$ et $(2.00001)^2$.

Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle - fonctions dérivées

1 Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle

Définition

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

- 1 On dit que une fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert $]a; b[$ si elle est dérivable en tout point de $]a; b[$.
- 2 On dit que une fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé $[a; b]$ si elle est dérivable :
 - a En tout point de l'intervalle ouvert $]a; b[$.
 - b A droite en a .
 - c A gauche en b .
- 3 On définit de façon analogue la dérivabilité d'une fonction sur les intervalles $[a; b[$ et $]a; b]$.

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et x un élément de I . On appelle la dérivée de f la fonction, notée f' , qui à pour tout x de I associe $f'(x)$ le nombre dérivé de f en x .

$$f' : x \mapsto f'(x)$$

2 Dérivées des fonctions usuelles

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I inclus dans son domaine de définition et f' sa dérivée. Le tableau ci-dessous donne la dérivée des fonctions les plus courantes :

Fonction $f(x) =$	Dérivée $f'(x) =$	f est définie sur	f est dérivable sur
k (constante)	0		$\mathbb{R}$
x	1		$\mathbb{R}$
$ax, a \in \mathbb{R}$	a		$\mathbb{R}$
x^2	$2x$		$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	nx^{n-1}		$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+ =]0; +\infty[$	$\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$	
$\cos(x)$	$-\sin(x)$		$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$		$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / (k \in \mathbb{Z}) \right\}$	

3 Opérations sur les fonctions dérivées

Propriété

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et k un réel. les fonctions $u + v$, uxv et kxu sont dérivables sur l'intervalle I , et on a pour tout x de I .

$$1 \quad (u + v)'(x) = u'(x) + v'(x).$$

$$2 \quad (u \times v)'(x) = u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x).$$

$$3 \quad (k.u)'(x) = k.u'(x). \text{ Si la fonction } v \text{ ne s'annule pas sur l'intervalle } I, \text{ alors les fonctions } \frac{1}{v} \text{ et } \frac{u}{v} \text{ sont dérivables sur } I, \text{ et on a pour tout } x \text{ de } I.$$

$$4 \quad \left(\frac{1}{v}\right)'(x) = -\frac{v'(x)}{(v(x))^2}.$$

$$5 \quad \left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x).v(x) - u(x).v'(x)}{(v(x))^2}.$$

Application

Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f dans chacun des cas :

1) $f(x) = 3$	2) $f(x) = 3x$	3) $f(x) = \frac{5}{2}x$	4) $f(x) = x^2$
5) $f(x) = x^7$	6) $f(x) = 2x^3$	7) $f(x) = 3x + 2$	8) $f(x) = x + \frac{1}{x}$
9) $f(x) = -x^2 + x - \frac{7}{2}$	10) $f(x) = \frac{2x}{x+1}$	11) $f(x) = \frac{-x^2 - x + 1}{x+1}$	12) $f(x) = \frac{4}{x}$
13) $f(x) = 2x^5 - \frac{x^3}{3}$	14) $f(x) = (3x+2)x^2$	15) $f(x) = (-2x+1)(x+1)$	16) $f(x) = \frac{-1}{x+1}$
17) $f(x) = 3 \cos(x)$	18) $f(x) = \cos^2(x)$	19) $f(x) = \sin(2x+1)$	20) $f(x) = x \sin(x^2+1)$

Conséquences

- 1 Toute fonction polynôme est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$.
- 2 Toute fonction rationnelle est dérivable en tout point où elle est définie.

4 Dérivée de la fonction $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

Propriété

Soit u une fonction définie sur un intervalle I .

Si u est strictement positive et dérivable sur I alors la fonction $\sqrt{u(x)}$ est dérivable sur I , et on a :

$$(\forall x \in I), (\sqrt{u})'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

Application

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2} \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

- 1 Monter que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.
- 2 Monter que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.

5 Dérivée de la fonction $x \mapsto (u(x))^n$

Propriété

Soit n un entier naturel non nul.

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I alors la fonction u^n est dérivable sur I , et on a :

$$\forall x \in I, ((u(x))^n)' = n \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{n-1}$$

Application

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + \sqrt{2}x - \frac{\pi}{3} \right)^7 \quad \text{et} \quad g(x) = \left(\frac{x}{x^4 + 1} \right)^5$$

- 1 Monter que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.
- 2 Monter que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.

6 Dérivée de la fonction $x \mapsto u(ax + b)$

Propriété

Soient a et b deux réels, et u est une fonction dérivable sur un intervalle J .

La fonction $x \mapsto u(ax + b)$ est dérivable sur tout intervalle I tel que pour tout x de I on a $(ax + b) \in J$

Application

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x - 3) \quad \text{et} \quad g(x) = \sin(-\sqrt{3}x + 1)$$

- 1 Monter que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.
- 2 Monter que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis déterminer sa dérivée.

Conséquences

Fonction $f(x) =$	Dérivée $f'(x) =$	f est définie sur	f est dérivable sur
$\cos(ax + b)$	$-a \sin(ax + b)$		$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$	$a \cos(ax + b)$		$\mathbb{R}$
$\tan(ax + b)$	$a(1 + \tan^2(ax + b))$		$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / (k \in \mathbb{Z}) \right\}$

7 Dérivées successives

Définition

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' sa fonction dérivée sur I .

- 1 Si f' est dérivable sur I , alors sa fonction dérivée, notée f'' ou $f^{(2)}$, est appelée dérivée seconde (ou dérivée d'ordre 2) de la fonction f .
- 2 Par itération, pour tout naturel $n \geq 2$, on définit la fonction dérivée d'ordre n , notée $f^{(n)}$, comme étant la fonction dérivée de la fonction dérivée d'ordre $(n - 1)$, et on a :

$$(f')' = f^{(2)} ; (f^{(2)})' = f^{(3)} ; \dots ; (f^{(n-1)})' = f^{(n)}$$

Application

Déterminer les dérivées d'ordre 1, 2 et 3 de la fonction f dans chacun des cas ci-après :

1 $f(x) = x^3 + x^2$

2 $f(x) = \cos(2x) - \sin(x^2)$

Applications

1 Sens de variations d'une fonction

Propriété

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- 1 La fonction f' est positive sur I si et seulement si la fonction f est croissante sur I .
- 2 La fonction f' est négative sur I si et seulement si la fonction f est décroissante sur I .
- 3 La fonction f' est nulle sur I si et seulement si la fonction f est constante sur I .

Remarque

- Si la fonction f' est strictement positive sur I (sauf en un nombre fini de points) alors la fonction f est strictement croissante sur I .
- Si la fonction f' est strictement négative sur I (sauf en un nombre fini de points) alors la fonction f est strictement décroissante sur I .

Application

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 1)^3$

- 1 Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa dérivée.
- 2 Étudier le signe de $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- 3 En déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2 Extremums d'une fonction sur un intervalle

Propriété

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I inclus dans son ensemble de définition et α un élément de I .

Si f admet un extremum en α alors $f'(\alpha) = 0$. En particulier, la tangente à la courbe représentative de f au point $(\alpha; f(\alpha))$ a pour pente $f'(\alpha) = 0$: c'est donc une droite horizontale.

Remarque

La propriété précédente se voit directement sur le tableau de variations, en effet :

- Un minimum local correspond au cas où la dérivée s'annule en α et un peu avant la dérivée est négative (donc la fonction est décroissante) et un peu après α la dérivée est positive (donc la fonction est croissante).
- Le cas d'un maximum local est similaire : la dérivée s'annule aussi, mais elle est positive avant α et négative après.

Corolaire

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I inclus dans son ensemble de définition et α un élément de I .

Si f' s'annule et change le signe en α alors f admet un extremum en α .

Application

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x - x^3$

- 1 Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- 2 Montrer que f admet un extremum sur chacun des intervalles $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$ et $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

3 Équation différentielle du type $y'' + w^2y = 0$ **Définition**

Soit w un réel non nul.

- 1 L'équation $y'' + w^2y = 0$, où l'inconnue y est fonction, est appelée **équation différentielle linéaire du second ordre** à coefficients constants.
- 2 Toute fonction f dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f'' + w^2f = 0$ est appelée solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y'' + w^2y = 0$.

Propriété

Soit w un réel non nul. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' + w^2y = 0$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto A \cos(wx) + B \sin(wx)$$

où A et B sont deux réels quelconques.

Remarque

- On peut aussi écrire la solution générale de l'équation $y'' + w^2y = 0$ sous la forme :

$$x \mapsto A \cos(wx + B) \quad \text{ou} \quad x \mapsto A \sin(wx + B)$$

où A et B sont deux réels quelconques.

Application

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1 $y'' + 9y = 0$

$$2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 2u(t) = 0$$

Yassine Elamri